

वैशाख-जेठमा गर्नुपर्ने कृषि कर्महरू

चैते धान खेती

फाल्गुन चैत्र महिनामा लगाएको चैते धानलाई यस समयमा सिंचाई राम्ररी दिनुपर्दछ । सिंचाई गर्दा धान पाक्नु भन्दा केही दिन अघिसम्म ५ से.मी. जति पानी धान खेतमा भईरहनुपर्दछ । यस समयमा चैते धान रोपेको ४०-५० दिनपछि गोडमेल गरी युरिया मलले टमड्रेस गर्नुपर्दछ । रासायनिक मल प्रयोग गर्दा माटो जचाई माटोको जाँचको आधारमा प्रयोग गरेमा बढी उपयोगी हुनु जानेछ । जस्ताको zink कमी देखिएमा धानको तल्लो पातहरूमा खैरो कल्था रंगको थोप्लाहरू देखिन्छन् र ती पातहरूपछि सुकेर जान्छन् । यस्तो अवस्थामा ५ के.जी. जिङ्ग सल्फेट र २.५ के.जी. कृषि चून १००० लिटर पानीमा मिसाई एक हेक्टरमा (३० कट्टा वा २० रोपनी) छर्कनुपर्दछ ।

पतेरो कीरा देखापरेमा ५% को मालाथिन धुलो २०-२५ के.जी. प्रति हेक्टरका दरले हावा नलागेको बेला विहानको समयमा छर्कनुपर्दछ । अरु कीराहरू देखा परेमा १ लिटर पानीमा १ मि.ली. मेटासिड र १ मि.ली. मेटासिष्टक्स प्रति २० वर्ग मिटरका दरले प्रयोग गर्ने अर्थात् प्रति रोपनी २५ लिटर पानीमा २५ मि.ली. मेटासिड र २५ मि.लि. मोसिष्टक्स वा प्रति कट्टा १६ लिटर पानीमा १६ मि.लि. मेटासिड र १६ मि.लि. मेटासिष्टक्स मिसाइ छर्कनुपर्दछ ।

मकै खेती :

पहाडी क्षेत्रहरूमा वर्षे मकै फागुन चैत्रमा लगाइन्छ । फागुन चैत्रमा लगाइएको मकैलाई यस समयमा गोडमेल गर्ने, भारपात हटाउने र छाँट्ने काम गरिन्छ । मकै छरेको १ महिना भित्र गोडमेल गरिएन भने उज्जनीमा हास आउँछ । मकैलाई सकेसम्म २ पटक भारपात उखेली उकेरा दिनुपर्दछ । मकैको उचाई घुँडासम्म आएपछि भारपात हटाई सिफारिस गरेको नाइट्रोजन मलको आधा भाग साइड ड्रेस गरेर दिनुपर्दछ । अझ सम्भव भए सिफारिस गरेको नाइट्रोजन मलको चौथाई भाग मकै घुँडा घुँडासम्म भएपछि दिने र बाँकी अर्को चौथाई भाग धान चमरा निस्कने बेलामा दिएको खण्डमा उत्पादन राम्रो हुन्छ ।

मकैमा गवारो कीराको रोकथामको लागि सेभिन विषादी ३-४ वटा गेडा प्रति बोट गुवोमा हाल्लाले नियन्त्रण हुन्छ । तराई, भित्री मधेश र बेंशीतिर वर्षे मकै साधारणतया वैशाखमा लगाउने गरिन्छ । जमिनलाई ४-५ पटक खनजोत गरी माटो बुरबुराउँदो बनाई प्रति हेक्टर (२० रोपनी वा ३० कट्टा) ८००-१००० डोको राम्ररी पाकेको गोबर वा कम्पोष्ट मल माटोमा राम्ररी मिलाउने र माटो जाँचको आधारमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्रति हेक्टर १५-२० के.जी. सम्म लाग्दछ । मकैलाई हलोको सियो पछाडि लाइनमा छरुवा गरेर रोप्ने गरिन्छ । लाइनमा मकै रोप्दा हारको दुरी ७५ से.मी. राख्नुपर्दछ । माटोको चिस्यान हेरी गहिराई ५ से.मी. कायम राख्नुपर्दछ ।

कोशेवाली

मुँग खेती :

मुँग गरम हावापानीमा फस्टाउन वाली हो । तराई र भित्री मधेशमा गहुँ काटेपछि मुँग खेती गर्ने गरिन्छ भने लगभग १५०० मिटर उचाईका इलाकाहरूमा चैत्र मध्येदेखि तापक्रम बढेपछि

मुँग लगाउन सकिन्छ । दोमट माटो तथा पानीको निकास राम्रो भएको जमिनमा यसको खेती राम्रो हुन्छ । जातहरु : पिं एस.-७, पूसा वैशाखी आदि हुन ।

भटमास खेती :

भटमासलाई ठाउँ हेरी वैशाख अन्तिम हप्तादेखि जेष्ठको दोश्रो हप्तासम्ममा लगाएमा उत्पादन राम्रो हुन्छ । अम्लिय माटो भए २५-७५ के.जी. कृषि चून प्रति रोपनीका दरले प्रयोग गर्नुपर्दछ । बीउ ६० के.जी. प्रति हेक्टर (२० रोपनी वा ३० कट्टा) लाग्दछ । भटमासलाई एकलो बालीको रूपमा लगाउँदा हारको दूरी ५०-६० से.मी. र बोटको दूरी ५ से.मी. को फरकमा कायम गरी रोपिन्छ । मकैसँग भटमास लगाउँदा १ मिटर फरक लगाएको मकैको हारको दुवैतर्फ २५ से.मि. छोडी हारमा भटमास रोपे राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ । धान खेतको आलीमा लगाउँदा १० से.मी. फरकमा लगाउन सकिन्छ ।